

BIOHUI®

博晖生物

核准日期: 2006年03月02日

修订日期: 2013年11月07日、2015年03月24日、2015年12月01日、2016年04月19日、2020年12月30日

核准日期: 2006年03月02日 修订日期: 2013年11月07日、2015年03月24日、2015年12月01日、2016年04月19日、2020年12月30日

人免疫球蛋白说明书

使用

请仔细阅读说明书并在医师指导下

完全排除含有病毒等未知病原体而引起血源性传染病。警告: 本品为血液制品, 只供经过筛选及不含有害物质, 但不能传播的可能。临床使用时应权衡利弊。

【禁忌】

【规格】

300mg/瓶 (10%, 3ml);
150mg/瓶 (10%, 1.5ml)。

【用法用量】

浆, 用法: 只限于肌肉注射, 不得用于静脉输注。
经低 用量: 遵医嘱。
滤处 预防麻疹: 为预防发病或减轻症状, 可在与麻疹患者
前和加。 接触7日内, 每次按体重注射0.05~0.15ml, 3~4次。
本注射液, 5~10ml, 以0.5~1.5ml剂量进行注射。
超过6ml。一次注射预防效果通常为2~4周。

不良反应

【不良反应】

尚待积累和规范不良反应的监测资料。少数人会出现
过敏反应, 如皮疹、痒痛反应, 尚待进一步处理, 可口服

通用名称 人免疫球蛋白

英文名称: Human Immunoglobulin

汉语拼音: Ren Mianyiqiudanbai

【成份】

主要成份为人免疫球蛋白。本品系由健康人血
经低温乙醇蛋白分离法与层析法分离纯化, 并
pH (pH4.0) 病毒灭活和DV50pH4纳米膜过
滤制成。不含防腐剂或抑菌剂, 不含动物

【性状】

应为无色或淡黄色澄清液体, 可带乳
浑液。

【适应症】

用于预防麻疹、水痘、

【禁忌】

1. 对免疫球蛋白过敏或有其他严重过敏史者。
2. 有IgA抗体的选择性IgA缺乏者。

【注意事项】

于抗体与抗原相互作用起到直接中和毒素与杀灭细菌和病毒，因此免疫球蛋白制品对预防细菌、病毒性感染有一定的作用。

毒理研究尚不清楚。

3. 运输及贮存过程中严禁冻结。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

未专门进行该项针对性试验研究，且无系统可靠的

【贮藏】

于2~8℃避光保存和运输。

【包装】

YBS00252013

60mg/瓶

50mg/瓶

北)有限公司

物制药(河北)有限公司

市鹿泉绿岛火炬开发区青山路6号

1-83935518

未专门进行该项针对性试验研究，且无系统可靠的
参考文献

【药物相互作用】

应单独使用。凡对免疫球蛋白有相互作用的药物可能会对本品产生相互作用。

【药物过量】

可能产生变异反应和因剂量大在注射部位造成疼痛感。

【药理毒理】

是把免疫球蛋白内含有的大量抗体输给受者，使之从低或无免疫状态很快达到暂时免疫保护状态，由

《中国药典》2025年版三部和
【批准文号】

国药准字S20063021

国药准字S20063020

【药品上市许可持有人】

博晖生物制药(河

【生产企业】

企业名称：博晖生

生产地址：石家庄

电话：0311